

LINEE TECNICHE DI DIFESA

Sono di seguito riportati gli aggiornamenti relativi alle “LINEE TECNICHE DI DIFESA E DISERBO 2016” sulla base delle disposizioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - operazione 10.1.1 produzione integrata - Reg. UE n. 1305/2013.

Le linee tecniche Agrion sono presentate secondo le fasi fenologiche delle diverse colture. Si ricorda che l'esecuzione di un trattamento deve essere eseguita sulla base della effettiva necessità valutata a seguito dei campionamenti e delle soglie di tolleranza riportati nella presente guida.

Le presenti linee tecniche sono vincolanti per tutti coloro che attuano la “difesa integrata volontaria” e rappresentano un riferimento per tutte le altre aziende che attuano la “difesa integrata obbligatoria”.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari (CLP), viene sospesa sino al 31/12/2017 il vincolo che impone, a parità di principio attivo, il formulato di minor tossicità.

Principi attivi revocati – nuove limitazioni

PRINCIPIO ATTIVO	AVVERSITA'/COLTURA	NOME COMMERCIALE	NOTA
Quinoxifen	Oidio – Pomacee e Drupacee	Arius	Prodotto candidato alla sostituzione il cui impiego è stato limitato ad alcuni casi particolari nelle linee guida nazionali

Principali variazioni di etichetta

PRINCIPIO ATTIVO	AVVERSITA'/COLTURA	NOME COMMERCIALE	NOTA
Thiametoxan	Afidi - Susino	Actara	Esclusione coltura SUSINO per aggiornamento etichetta
Pirimicarb	Afidi – Pomacee e Drupacee	Pirimor	Limitazione a 1 trattamento massimo all'anno su Pomacee e Drupacee
Clorpirifos metile	Lepidotteri ecc – Pomacee e Drupacee	Reldan Runner ecc	Al massimo 1 trattamento all'anno su pomacee e pesco in produzione – 2 trattamenti su pesco in allevamento
Clorpirifos etile	Lepidotteri ecc – Pomacee e Drupacee	Dursban ecc	Esclusione da Pesco Intervenire sino alla fioritura su Pomacee
Imidacloprid, Thiametoxan, Clotianidin	Afidi – Pomacee e Drupacee	Confidor ecc Actara Dantop	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità

Nuovi inserimenti

PRINCIPIO ATTIVO	AVVERSITA'	NOME COMMERCIALE	NOTA
Fosfonato di potassio + dithianon	Ticchiolatura	Delan PRO	Al massimo 6 interventi all'anno
Fenpyrazamine	Monilia – Pesco e Albicocco	Prolectus 50 WG	Al massimo 2 interventi all'anno
Pyraflufen - etile	Diserbo - Actinidia	Pyramax ecc	1.6 l/ha/anno

Bagnanti revocati

Si allega l'elenco dei bagnanti che sono stati revocati a partire dal 31/12/2015 e non più utilizzabili:

Prodotto	N° reg.	Data reg.	Impresa
ADESIL A	2950	08/11/1978	SEPRAN SAS
ADESVIN	2082	06/04/1976	CHEMIA S.P.A.
ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP	6376	06/05/1985	BASF ITALIA S.R.L.
ASTROL NUOVO	12492	02/02/2005	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
ATPLUS G	8526	30/07/1994	SYNGENTA ITALIA S.P.A.
BAGIR MAX	346	13/12/1972	SUMITOMO CHEMICAL ITALIA
BAGNANTE AC	6786	01/10/1986	CHEMIA S.P.A.
BAGNANTE ADESIVO NON IONICO	2288	08/07/1976	TECNITERRA S.R.L.
BAGNANTE ADESIVO S	2357	20/12/1976	SIVAM S.P.A.
BAGNANTE AG N	1727	21/05/1974	SIPCAM ITALIA S.P.A.
BAGNANTE AGN L	11374	18/06/2002	SIPCAM ITALIA S.P.A.
BAGNANTE AGRICO	4351	19/05/1981	AGRICO S.R.L.
BAGNANTE AGRISYSTEM	12216	08/09/2004	SCAM S.P.A.
BAGNANTE ANTISCHIUMA NT	6554	30/10/1985	SIPCAM ITALIA S.P.A.
BAGNANTE ANTISCHIUMA S	361	22/11/1971	SIPCAM ITALIA S.P.A.
BAGNANTE COMPO	13650	16/03/2007	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
BAGNANTE DEMETRA	6268	30/04/1985	DEMETRA ITALIA S.R.L.
BAGNANTE GREEN	13035	12/05/2006	GREEN RAVENNA
BAGNANTE L	12619	18/05/2005	GOWAN ITALIA S.P.A.
BAGNANTE LBI	12442	24/01/2005	LBI
BAGNANTE MANICA	12985	01/02/2006	CHEMIA S.P.A.
BAGNANTE NEUTRO	6708	04/06/1986	DEMETRA ITALIA S.R.L.
BAGNANTE PLUS	12992	01/02/2006	CHEMIA S.P.A.
BAGNANTE SCAM	5657	02/02/1984	SCAM S.P.A.
BREAK-THRU S240	13129	03/02/2006	EVONIK DEGUSSA GMBH
CERTOIL	12773	27/09/2005	XEDA INTERNATIONAL S.A.
DIPPER	6632	18/03/1986	KOLLANT S.R.L.
ETRAVON	1600	06/10/1976	SYNGENTA ITALIA S.P.A.
ETRAVON SYNGENTA	40	26/07/1971	SYNGENTA ITALIA S.P.A.
FITOIL	12046	12/07/2004	XEDA INTERNATIONAL S.A.
FLUVIUS	12193	12/07/2006	EVONIK DEGUSSA GMBH
FRIGATE SDS	6420	06/05/1985	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
IROL PLUS	4157	20/12/1980	SUMITOMO ex ISAGRO S.P.A.
KANTOR	13730	30/11/2011	XEDA INTERNATIONAL S.A.
LIOSOL	2175	13/04/1976	AGRIPHAR S.A.
LIOSOL BETA	6719	04/06/1986	AGRIPHAR S.A.
MICRO-DROP	1765	23/10/1974	GOWAN ITALIA S.P.A.
MIRANDA VERDE	1683	24/10/1974	AGRIPHAR S.A.
PRUNIG	1362	18/01/1974	GUABER S.R.L.
PULIFRUT	10277	13/01/2000	SIPCAM ITALIA S.P.A.
PULIFRUT L	10675	22/01/2001	GOWAN ITALIA S.P.A.
TEGOPLANT	12194	24/07/2006	EVONIK DEGUSSA GMBH
TREND AS	13237	09/09/2006	SIPCAM ITALIA S.P.A.
VALSOL	2412	23/12/1976	DEMETRA ITALIA S.R.L.
VAPOR GARD	10116	30/07/1999	CBC (EUROPE) S.R.L.
VEDO BLU	14218	09/05/2008	GOWAN ITALIA S.P.A.
WILT-GARD	16017	10/04/2014	CBC (EUROPE) S.R.L.
ZARADO	13458	31/07/2009	CBC (EUROPE) S.R.L.

PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE LINEE GUIDA

1. Diversamente dalle linee guida nazionali e regionali e unicamente per agevolare la consultazione da parte dell'utenza, la strategia di difesa fa riferimento alla fase fenologica di ogni singola coltura
2. **Riguardo al formulato commerciale:**

Per brevità, nel caso siano presenti più formulati per lo stesso principio attivo si fa riferimento ad uno solo con il dosaggio indicato per quel formulato. PER QUESTA RAGIONE E' FONDAMENTALE LA LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI ONDE EVITARE ERRORI NEI DOSAGGI ECC

Dosaggi

- ✓ La dose/hl è quella che si ritiene efficace per quell'avversità in quel periodo comunque mai superiore e non inferiore a quella riportata in etichetta;
- ✓ Si tenga presente che in qualunque caso si deve far riferimento alla dose massima per ettaro (ha) riportata in etichetta;
- ✓ Sui prodotti meno recenti può mancare tale riferimento e di conseguenza si dovrà assumere la dose/hl riferita a 15 hl di acqua distribuiti ad ettaro.

Attenzione:


Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di leggere attentamente le etichette dei prodotti verificando le avversità registrate, dosaggi, tempi di carenza, numero di interventi massimo consentito all'anno e altre eventuali disposizioni.

DISCIPLINARE DI DIFESA DEL MELO

Stadi fenologici secondo Fleckinger - Scala BBCH




**A Gemma d'inverno
BBCH00**




**A Ingrossamento gemme
BBCH01**



**B Rottura gemme
BBCH07**



**C Punte verdi
BBCH09**



**C3 Orecchiette di topo
BBCH10**



**D Mazzetti affioranti
BBCH53**



**D3 Mazzetti divaricati
BBCH56**



**E Bottoni rosa
BBCH57**



**F Apertura fiore centrale
BBCH60**



**F2 Piena fioritura
BBCH65**



**G Caduta petali
BBCH65**







**H Fine caduta petali
BBCH69**







**I Allegagione
BBCH72**






**J Ingrossamento frutti
BBCH79**


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
GEMME IN RIPOSO INVERNALE  BBCH 00	CANCRI RAMEALI COCCINIGLIA S. JOSE'	PRODOTTI RAMEICI	VARI	varia	varia	20	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva	
		OLIO MINERALE + ZOLFO	POLITHIOL	5000 - 6000	75 - 90	20		
		OLIO MINERALE	VARI	3000	45	20		
ROTTURA GEMME  BBCH 07	ANTONOMO	FOSMET	SPADA WDG ecc	319	3,19	28	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con il FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno	
PUNTE VERDI - MAZZETTI AFFIORANTI  BBCH 07 - 53	TICCHOLIATURA	DODINA	SILLYT 65 ecc	70 - 80	1,38	40	Al massimo 3 trattamenti all'anno	
		PROPINEB (4)	ANTRACOL 70 WG	150	2,25	-	(4) Al massimo 3 interventi entro la fase di caduta petali, con il limite di 6 trattamenti complessivi per il gruppo dei ditiocarbammati.	
		MANCOZEB (4)	DITHANE M-45 ecc	200	2	28	(4) Al massimo 3 interventi entro la fase di caduta petali, con il limite di 6 trattamenti complessivi per il gruppo dei ditiocarbammati. SE SI USA MANCOZEB NON SI POSSONO SUPERARE I 5 KG/HA/ANNO DI RAME. Per ogni formulato leggere attentamente il n° max di trattamenti ammessi all'anno.	
		METIRAM	POLYRAM DF ecc	200	2,6	21	Non UTILIZZABILE dopo la fase di frutto noce per un massimo di 3 volte. Al massimo 6 trattamenti all'anno con i DITIOCARBAMMATI Al massimo 3 trattamenti all'anno	
ORECCHIETTE DI TOFO  BBCH 10	OIDIO	PRODOTTI RAMEICI	VARI	varia	varia	20	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva	
		BUPIRIMATE	NIMROD	30 - 60	0,9	14		Fitotossico su cv Imperatore
		ZOLFO	VARI	varia	varia	5		-
		CYFLUFENAMIDE	CIDELY ecc	30 - 50	0,5	14		Al massimo 2 interventi all'anno
	COCCINIGLIA S. JOSE'	PYRIPROXIFEN	JUVINAL GOLD ecc LASCAR ecc	35 - 40 (dosaggio riferito a un volume di acqua 600 - 1500 l/ha) 37,5 - 50 (dosaggio riferito a un volume di acqua 800 - 1000 l/ha)	0,21 - 0,6 0,3 - 0,5	Treatmento ammesso prima della fioritura	Impiegabile solo prima della fioritura	


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ORECCHIETTE DI TOPO  BBCH 10	COCCINIGLIA S. JOSE'	BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-
	PSILLE VETTRICI DI SCOPAZZI	CLOPPIRIFOS ETILE	DURSBAN 75 WG ecc	70	1,05	90	1 trattamento all'anno in prefioritura in alternativa a clorpirifos metile e etofenprox. Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici.
		CLOPPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	1 trattamento all'anno in prefioritura in alternativa a clorpirifos etile e etofenprox. Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici.
MAZZETTI DIVARICATI - BOTTONI ROSA  BBCH 56 - 57		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
		TAU-FLUVALINATE	MAVRIK, KLARTAN ecc	40 - 120	0,6	30	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
		AZADIRACTINA	NEEMAZAL-T/S ecc	200	3	3	-
		ACETAMIPRID (1)	EPIK SL	100 - 150	2	14	(1) Prodotti in alternativa tra loro, al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, 1 solo nel caso si utilizzi THIACTOPRID
		FLONICAMID	TEPPEKI	9,3	0,14	21	ACETAMIPRID UNICO NEONICOTINOIDE UTILIZZABILE PRIMA DELLA FIORITURA Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, comunque non più di 2 trattamenti all'anno con questa s.a. indipendentemente dall'avversità
		TIOFANATE METILE	ENOVIT METILE FL ecc	90 - 110	1,4	7	Trattamenti ammessi solo in presenza accertata della malattia. Al massimo 2 trattamenti all'anno dopo la raccolta e non oltre la fase di prefioritura previa autorizzazione del tecnico.
		DODINA	SILLYT 65 ecc	70 - 80	1,38	40	Al massimo 3 trattamenti all'anno
		PROPINEB (4)	ANTRACOL 70 WG	150	2,25	-	(4) Al massimo 3 interventi entro la fase di caduta petali, con il limite di 6 trattamenti complessivi per il gruppo dei ditiocarbammati.
		MANCOZEB (4)	DITHANE M-45 ecc	200	2	28	(4) Al massimo 3 interventi entro la fase di caduta petali, con il limite di 6 trattamenti complessivi per il gruppo dei ditiocarbammati. SE SI USA MANCOZEB NON SI POSSONO SUPERARE I 5 KG/HA/ANNO DI RAME. Per ogni formulato leggere attentamente il n° max di trattamenti ammessi all'anno.
		METIRAM	POLYRAM DF ecc	200	2,6	21	Non UTILIZZABILE dopo la fase di frutto noce per un massimo di 3 volte. Al massimo 6 trattamenti all'anno con i DITIOCARBAMMATI Al massimo 3 trattamenti all'anno


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
MAZZETTI DIVARICATI - BOTTONI ROSA  BBCH 56 - 57	TICCHOLIATURA	DITHIANON	DELAN 70 WG	50 - 120	1,8	21	Tra CAPTANO e DITHIANON al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità		
		DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	170	2,5	35	Al massimo 6 interventi, nel limite della somma dei 12 trattamenti tra DITHIANON e CAPTANO		
		FLUAZINAM	BANJO ecc	70 - 100	1	60	Al massimo 3 trattamenti all'anno (con il prodotto Ohayo 1 solo trattamento anno)		
		PYRIMETHANIL (5)	SCALA ecc	75 - 100	1,1 - 1,5	56	(5) Con questi prodotti (anilopirimidine) al massimo 4 interventi all'anno Consigliabile la miscela con altro prodotto di copertura		
		PYRIMETHANIL (5) + DITHIANON	VISION PLUS	80	1,2	56	Non Miscelare Vision Plus con il Clorpirifos - metile		
		CYPRODINIL (5)	CHORUS	30 - 50	0,45 - 0,75	21	Al massimo 3 trattamenti all'anno		
		POLISOLFURO DI Ca	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENO	2000	24	30	-		
		LAMINARINA	VACCIPLANT	-	1	-			
		FIORITURA BBCH 65 CADUTA PETALI  BBCH 69	TICCHOLIATURA	METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflururon - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - tebufenozide) non deve essere superiore a 4
				TEBUFENOZIDE (2)	MIMIC ecc	80	0,9	14	CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLURURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO
CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN			20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM			300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
INDOXACARB	STEWARD			16,5	0,198	7	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
BACILLUS THURINGENSIS	VARI			Varie	Varie	3	-		
Trattamenti SOLO su autorizzazione del Settore Fitosanitario Regionale									
I trattamenti eseguiti contro gli Afidi con IMIDACLOPRID e ACETAMIPRID sono altresì efficaci contro la TENTREDINE									
TENTREDINE AFIDE GRIGIO									

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
CADUTA PETALI  BBCH 69	TENTREDINE AFIDE GRIGIO	THIAMETOXAM (1)**	ACTARA 25 WG	30 - 40	0,45	14	(1) Con 1 NEONICOTINOIDE al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, 1 solo nel caso si utilizzi THIACLOPRID		
		IMIDACLOPRID (1)**	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	28	ACETAMIPRID: al massimo 2 trattamenti all'anno THIAMETOXAN, IMIDACLOPRID E CLOTHIANIDIN: al massimo 1 intervento all'anno		
		ACETAMIPRID (1)	EPIK SL	100 - 150	2	14	** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi IMIDACLOPRID, THIAMETOXAN, CLOTHIANIDIN POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA		
		CLOTHIANIDIN (1)**	DANTOP 50 WG	15	0,225	14	Effettuare lo sfalcio delle fioriture naturali prima del trattamento.		
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5	200	2,2	7	Al massimo 1 intervento all'anno		
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità DOPO LA FIORITURA		
		FLONICAMID	TEPEKI	9.3	0,14	21	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, comunque non più di 2 trattamenti all'anno con questa s.a. indipendentemente dall'avversità		
		Trattamenti con ZOLFO da caduta petali contro altre avversità sono altresì efficaci contro questo acaro							
		ERIOFIDE	EXITIAZOX	MATACAR FL ecc	20	0,3	14	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità	
			ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	28	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità per un massimo di 2 sulla coltura indipendentemente dall'avversità	
DITHIANON	DELAN 70 WG		50 - 120	1,8	21	Tra CAP TANO e DITHIANON al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità			
DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO		170	2,5	35	Al massimo 6 interventi, nel limite della somma dei 12 trattamenti tra DITHIANON e CAPTANO			
FLUAZINAM	BANJO ecc		70 - 100	1	60	Al massimo 3 trattamenti all'anno (con il prodotto Ohayo 1 solo trattamento anno)			
TICCHOLIATURA	POLISOLFURO DI Ca	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	1500	18	30	-			
	DITIANON + PYRACLOSTROBIN	MACCANI	167	2,5	35	Le strobilurine (pyraclostrobin - trifloxistrobil) non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno indipendentemente dall'avversità			
	PYRIMETHANIL (5) + DITHIANON	VISION PLUS	80	1,2	56	(5) Con questi prodotti (anilino pirimidine) al massimo 4 interventi all'anno Non Miscelare Vision Plus con il Clorpirifos - metile			

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
CADUTA PETALI  BBCH 69	TICCHIALATURA	PENTHIOPYRAD	FONTELIS	75	0,9	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con Fontelis Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente		
		FLUOPYRAN + TEBUCONAZOLO	LUNA EXPERIENCE	50	0,75	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con Luna Experience Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente		
		DIFENOCONAZOLO (3)	SCORE 25 EC ecc	15	0,225	14	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente. DIFENOCONAZOLO: al massimo 4 trattamenti all'anno		
		PENCONAZOLO (3)	TOPAS 10 EC ecc	40	0,6	14			
		TETRACONAZOLO (3)	DOMARK 125 ecc	30	0,3	14			
		ALLEGAGIONE  BBCH 72	AFIDE GRIGIO	MICLOBUTANIL (3)	THIOCUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	15	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO, PENCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno
				CIPROCONAZOLO (3)	CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	7	
				TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	40 - 60	0,6	14	-
				ZOLFO	VARI	varia	varia	5	
				AFIDE GRIGIO	CLOTHIANIDIN (1)**	DANTOP 50 WG	15	0,225	14
PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5				200	2,2	7	Al massimo 1 intervento all'anno	
FILLOMATORI (Cemistoma, Litocollele) AFIDE GRIGIO	AFIDE GRIGIO			SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità DOPO LA FIORITURA
				IMIDACLOPRID (1)**	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	28	(1) Con i NEONICOTINOID al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, 1 solo nel caso si utilizzi THIACLOPRID
				THIAMETOXAM (1)**	ACTARA 25 WG	30 - 40	0,45	14	ACETAMIPRID: al massimo 2 trattamenti all'anno THIAMETOXAN, IMIDACLOPRID E CLOTHIANIDIN: al massimo 1 intervento all'anno ** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi IMIDACLOPRID, THIAMETOXAN, CLOTHIANIDIN POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA
				ACETAMIPRID (1)	EPIK SL	100 - 150	2 (1,5 contro filloatori)	14	Effettuare lo sfalcio delle fioriture naturali prima del trattamento.

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
<p>ALLEGAGIONE</p>  <p>BBCH 72</p>	<p>FILLOMINATORI (Cerniosoma, Litocollete)</p>	CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	16 - 18	0,27	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		DIFLUBENZURON (2)	INDIPENDENT 25 PB ecc	60	0,9	45	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - tebufenozide) non deve essere superiore a 4 CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO		
		SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad		
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		TEBUFENOZIDE (2)	MIMIC ecc	80	0,9	14	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - tebufenozide) non deve essere superiore a 4 CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO		
		METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	16 - 18	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad		
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		CLORPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con il CLORPIRIFOS METIL al massimo 1 trattamenti all'anno		
		<p>CARPOCAPSA</p>	<p>INSTALLAZIONE CONFUSIONE SESSUALE SECONDO LE INDICAZIONE DEL CENTRO DI ASSISTENZA AGRION</p>						
			DIFLUBENZURON (2)	INDIPENDENT 25 PB ecc	80	1,2	45	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - tebufenozide) non deve essere superiore a 4	
TRIFLUMURON (2)	ALSYSTIN		25	0,375	28	CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO			
METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc		40	0,6	14				

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ALLEGAGIONE  BBCH 72	CARPOCAPSA	CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		VIRUS DELLA GRANULOSI	CARPOVIRUSINE EVO 2 ecc	100	1	3	Per il numero di trattamenti massimi fare riferimento alle etichette dei diversi prodotti
		CLORPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno
		FOSMET	SPADA 50 WG ecc	150	1,5	28	
	CARPOCAPSA + ERIOFIDE	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA	VOLIAM TARGO	75	1,2	14	Con abamectina al massimo 1 intervento all'anno contro l'eriofide
	AFIDE LANIGERO	THIAMETOXAM (1)	ACTARA 25 WG	30	0,45	14	(1) Con i neonicotinoidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, 1 solo nel caso si utilizzi THIAACLOPRID ACETAMIPRID: al massimo 2 trattamenti all'anno THIAMETOXAN, IMIDACLOPRID E CLOTHIANIDIN: al massimo 1 intervento all'anno ** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi imidacloprid, thiametoxan, clothianidin POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA Effettuare lo sfalcio delle fioriture naturali prima del trattamento.
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità dopo la fioritura
		DITHIANON	DELAN 70 WG	50 - 120	1,8	21	Tra CAPTANO e DITHIANON al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
		DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	170	2,5	35	Al massimo 6 interventi, nel limite della somma dei 12 trattamenti tra dithianon e captano
	TICCHIOLATURA	FLUAZINAM	BANJO ecc	70 - 100	1	60	Al massimo 3 trattamenti all'anno (con il prodotto Ohayo 1 solo trattamento anno)
		POLISOLFURO DI Ca	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	1500	18	30	-
		PENTHIOPYRAD	FONTELIS	75	1,125	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con Fontelis Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ALLEGAGIONE  BBCH 72	TICCHIALATURA	FLUOPYRAN + TEBUCONAZOLO	LUNA EXPERIENCE	50	0,75	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con Luna Experience Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente	
		TRIFLOXISTROBIN	FLINT	15	0,225	14	Le strobilurine (pyraclostrobin - trifloxistrobin) non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno indipendentemente dall'avversità Con BOSCALID al massimo 3 trattamenti all'anno	
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente	
		LAMINARINA	VACCIPLANT	-	1	-		
	OIDIO	DIFENOCONAZOLO, FENBUCONAZOLO e altri IBE indicati a CADUTA PETALI						
		BUPIRIMATE	NIMROD	30 - 60	0,9	14	Fitotossico su cv Imperatore	
		ZOLFO	VARI	varia	varia	5	-	
		CYFLUFENAMIDE	CIDELY ecc	30 - 50	0,5	14	Al massimo 2 interventi all'anno	
		(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO, PENCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno						
		RODILEGNO ROSSO (Cossus cossus)	Cattura massale					
RODILEGNO GIALLO (Zeuzera pyrina)	Installazione Confusione Sessuale							
	TRIFLUMURON (2)	ALSYTIN	25	0,375	28	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - Tebufenozide) non deve essere superiore a 4		
COLPO DI FUOCO	ACYBENZOLAR-S-METILE	BION 50 WG	15	0,2	7	CON TRIFLUMURON al massimo 2 trattamenti all'anno Al massimo 6 interventi all'anno		
	PRODOTTI RAIMEICI	POLTIGLIA DISPERS ecc	250	6	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva		
INGROSSAMENTO FRUTTO (DA GIUGNO) BBCH 74 - 79	CLOPPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici.		
	FOSMET	SPADA WDG ecc	319	3,19	28	Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno		

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
INGROSSAMENTO FRUTTO (DA GIUGNO)	COCCINIGLIA S. JOSE'	SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità dopo la fioritura
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-
		CLOTRANILIPROLE	CORAGEN	16 - 18	0,27	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
	AFIDE VERDE (reinfestazione)	FLONICAMID	TEPEKI	9.3	0,14	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5	200	2.2	7	Al massimo 1 intervento all'anno
	CARPOCAPSA	CLORPİRİFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici.
		FOSMET	SPADA 50 WG ecc	150	1,5	28	Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno
		THIACLOPRID	CALYPSO	25	0,375	14	Al massimo 2 trattamenti all'anno. 1 solo nel caso si utilizzi un altro neonicotinoide (imidacloprid, thiametoxan acetamiprid, clothianidin)
		SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
	SESIA	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		CLORPİRİFOS ETILE	DURSBAN 75 WG ecc	55 - 70	-	90	Il trattamento va localizzato sul tronco e sul punto d'innesto, per cui non rientra nelle precedenti limitazioni
METOXIFENOZIDE (2)		PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflururon - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozone - Tebufenozone) non deve essere superiore a 4 CON METOXIFENOZIDE massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO	
RICAMATORI (Pandernis, Eulita)	SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	

INGROSSAMENTO FRUTTO (DA GIUGNO)



BBCH 74 - 79

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
INGROSSAMENTO FRUTTO (DA GIUGNO)  BBCH 74 - 79	RICAMATORI (Pandemis, Eulia)	CLOPPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Compressivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno	
		INDOXACARB	STEWARD	16.5	0,247	7	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente l'avversità	
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	100	1.5	3	-	
		DITHIANON	DELAN 70 WG	50 - 120	1.8	21	Tra captano e dithianon al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	
		DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	170	2,5	35	Al massimo 6 interventi, nel limite della somma dei 12 trattamenti tra dithianon e captano	
	CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150 - 160	2	21	Tra captano e dithianon al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità ATTENZIONE: sul gruppo Red Delicious non impiegare captano sino alla seconda decade di giugno onde evitare fenomeni di fitotossicità		
	FLUAZINAM	BANJO ecc	70 - 100	1	60	Al massimo 3 trattamenti all'anno (Attenzione alla carenza se impiegato in questa fase - con il prodotto Ohayo 1 solo trattamento anno)		
	PENTHIOPYRAD	FONTELIS	75	1,125	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con Fontelis		
	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente Le strobilurine (pyraclostrobin - trifloxistrobin) non sono utilizzabili più di 4 volte all'anno indipendentemente dall'avversità		
	PRODOTTI RAMEICI	POLTIGLIA DISPERSS ecc	100 - 200	1,5 - 3	7	Con BOSCALID al massimo 3 trattamenti all'anno Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 3 trattamenti all'anno complessivamente		
	ZOLFO	THIOPRON ecc	200 - 500	3 - 6	5	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva		
	BICARBONATO DI POTASSIO	ARMICARB 85 ecc	320	5	1	Al massimo 5 trattamenti all'anno Applicare dallo stadio di frutto noce BBCH73 fino a quando il frutto ha raggiunto metà della sua taglia finale BBCH75		
	DIFENOCONAZOLO e altri IBE presenti a CADUTA PETALI							(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente. MICLOBUTANIL, TEBU/CONAZOLO, CIPROCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
INGROSSAMENTO FRUTTO (DA GIUGNO)	CYDIA DEL PESCO	METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozone - tebufenozide) non deve essere superiore a 4 CON METOXIFENOZIDE massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO		
		CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità		
		SPINOSAD	SUCCESS ecc	80 - 120	1,8	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad		
			LASER ecc	30	0,45				
		PIRALIDE	VIRUS DELLA GRANULOSI	BACILLUS THURINGENSIS	MADEX TWIN ecc	10	0,1	3	-
					VARI	100	1,5	3	-
					STEWART	16.5	0,247	7	Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno e comunque non più di 4 indipendentemente dall'avversità
		CIMICE (HALYOMORPHA HALYS)	ACETAMIPRID (1)	EPIK	100 - 150	2	14	1 solo trattamento nel caso si utilizzi THIACTOPRID	
MAVRİK, KLARTAN ecc	40 - 120				0,6	30	Al massimo 1 intervento all'anno		
CLORPIRIFOS METILE	200				4	21	Complessivamente 4 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno		
INGROSSAMENTO FRUTTO (AGOSTO - SETTEMBRE)	MOSCA DELLA FRUTTA	DELTA METRINA - ESCA	MAGNET MED	-	50 - 75 unità ettaro	-	Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi alimentari		
			Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, 2 interventi per le cvs raccolte dopo il 15 settembre						
PRE-RACCOLTA	MARCUMI DA CONSERVAZIONE	CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150 - 160	2	21	Tra CAPTANO e DITHIANON al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità		
BBCH 74 - 79									



EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE G-ML/HL	DOSE KG-L/HA	CARENZA GG	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
PRE-RACCOLTA BBCH 74 - 79	MARCUMI DA CONSERVAZIONE	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Le strobilurine (pyraclostrobin - trifloxistrobin) non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno indipendentemente dall'avversità Con BOSCALID al massimo 3 trattamenti all'anno Con gli SDHI Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente Al massimo 1 intervento all'anno
		FLUDIOXONIL	GEOXE	30	0,45	3	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva
		PRODOTTI RAMEICI	POLTIGLIA DISPERSI ecc	200 - 300	3 - 4,5	7	Trattamenti ammessi solo in presenza accertata della malattia. Al massimo 2 trattamenti all'anno dopo la raccolta e non oltre la fase di prefloritura previa autorizzazione del tecnico.
DOPO RACCOLTA BBCH 93	CANCRI RAMEALI	TIOFANATE METILE	ENOVIT METILE ecc	90 - 110	1,4	7	Tra CAPTANO e DITHIANON al massimo 12 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
		DITHIANON	DELAN 70 WG	100 - 120	1,8	21	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva
	BATTERIOSI NECTRIA	RAMEICI	VARI	500 - 1000	7,5 - 15	20	
AVVERSA' OCCASIONALI							
AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA CONSIGLIATA	RAGNO ROSSO	PIRIDABEN	NEXTER	50 - 75	1	14	Al massimo 1 trattamento acaricida all'anno E' possibile impiegare CLOFENTEZINE, EXITIAZOX ed ETOXAZOLE in miscela con un adulticida ABAMECTINA utilizzabile complessivamente 2 volte all'anno: 1 intervento contro ERIOFIDE e 1 contro RAGNO ROSSO
		CLOFENTEZINE	APOLLO SC ecc	30	0,4	35	
		EXITIAZOX	MATACAR FL ecc	20	0,3	14	
		TEBUFENPYRAD	MASAI 20 WP	33	0,5	7	
		ETOXAZOLE	BORNEO	35 - 50	0,5	28	
		MILBEMECTINA	MILBEKNOK	100 - 125	1,875	14	
		ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	28	
		ACEQUINOCYL	KANEMITE	120	1,8	30	
		BIFENAZATO	ACRAMITE 480 SC	50 - 67	0,75 - 1	14	
		FOSETILAL	ALLETTE ecc	250	3,75	28	
DALLA RIPRESA VEGETATIVA	MARCUME DEL COLLETO	METALAXIL M	RIDOMIL GOLD SL ecc	1 - 2 ml/mq alla base della pianta	-	28	Per il numero di trattamenti massimi fare riferimento alle etichette dei diversi prodotti Al massimo 2 trattamenti contro l'avversità N.B. NON TUTTI I FORMULATI SONO REGISTRATI CONTRO QUESTA AVVERSA'
AUTUNNO PRIMAVERA		BROMADIOLONE	AGRIRAT G	-	15	-	Autorizzazione per emergenza fitosanitaria dal 7 novembre 2016 al 7 marzo 2017
AUTUNNO	ARVICOLE	ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata
DALLA RIPRESA VEGETATIVA	LIMACCE	METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-	
		UNGULATI	TRICO	-	15 - 20	-	-

DISCIPLINARE DI DIFESA DEL PERO

Stadi fenologici secondo Fleckinger - Scala BBCH



A Gemma d'inverno
BBCH00




B Gemma gonfia
BBCH01



C Apertura gemme
BBCH07



D Comparsa mazzetti
BBCH53



D1 Comparsa mazzetti
BBCH53



E Mazzetti divaricati
BBCH59



F Fioritura
BBCH65






G Caduta petali
BBCH69







H Allegagione
BBCH72





J Ingrossamento frutti
BBCH74-79



EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI		
GEMME GONFIE 	NECTRIA	PRODOTTI RAMEICI	VARI	vari	vari	20	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva		
		DITHIANON	DELAN 70 WG	150	2,25	21	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
BBCH 01	COCCINIGLIA ERIOFIDE VESCICOLOSO	OLIO MINERALE	VARI	2000 - 3000	45	20	-		
		OLIO MINERALE + ZOLFO	POLITHIOL	5000 - 6000	75 - 90	20	-		
ROTTURA GEMME 	ERIOFIDE VESCICOLOSO	ZOLFO	THIOPRON	300 - 400	4,5	5	-		
		PROTEINATO DI ZOLFO	SULFAR ecc	500	7,5	5	-		
		ABAMECTINA	VERTIMEC PRO	75	1,2	28	Con Abamectina al massimo 1 intervento all'anno contro l'eriofide vescicoloso e al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall'avversità		
		ACETAMIPRID	EPIK SL	100	1,5	14	Al massimo 1 trattamento all'anno contro l'Antonomo ACETAMIPRID: al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
COMPARSA MAZZETTI - MAZZETTI DIVARICATI 	TICCHOLIATURA + MACULATURA BRUNA	PYRIPROXIFEN	JUVINAL GOLD ecc	35 - 40 (dosaggio riferito a un volume di acqua 600 - 1500 l/ha)	0,21 - 0,6	Trattamento ammesso prima della fioritura	Impiegabile solo prima della fioritura		
			LASCAR ecc	37,5 - 50 (dosaggio riferito a un volume di acqua 800 - 1000 l/ha)	0,3 - 0,5				
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-	-	
		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200 - 250	3	35	Al massimo 4 interventi all'anno E' consentito l'uso dei ditocarbammati solo fino a 40 giorni dalla raccolta		
		PRODOTTI RAMEICI	SELECTA DISPERS ecc	200 - 300	4,5	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva		
		METIRAM	POLYRAM DF	200	2,6	21	Al massimo 3 trattamenti all'anno. E' consentito l'uso dei ditocarbammati solo fino a 40 giorni dalla raccolta.		
		PROPINEB	ANTRACOL 70 WG	150	2,25	-	Al massimo 2 interventi all'anno, da impiegare entro la fase di caduta petali		
		DITHIANON	DELAN 70 WG	80	1,2	21	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità		
		BBCH 53 - 59	TICCHOLIATURA	DITHIANON	DELAN 70 WG	80	1,2	21	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
COMPARSA MAZZETTI - MAZZETTI DIVARICATI  BBCH 53 - 59	TICCHIALATURA	DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	170	2,5	35	Con il FOSFONATO DI POTASSIO al massimo 6 interventi all'anno. Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
		PYRIMETHANIL (5)	SCALA ecc	75 - 100	1,5	56	(5) con questi prodotti (anilinoipirimidine) al massimo 4 interventi all'anno Consigliabile la miscela con un prodotto ad azione preventiva
		CYPRODINIL (5)	CHORUS	50	0,75	21	Con CYPRODINIL al massimo 2 trattamenti all'anno CON CYPRODINIL AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO
		DODINA	SYLLIT 65 ecc	70 - 120	1,38	40	Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		PYRIMETHANIL (5) + DITHIANON	VISION PLUS	80	1,2	56	(5) Con le anilinoipirimidine al massimo 4 interventi all'anno
		POLISOLFURO DI Ca	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	2000	24	30	Non Miscelare Vision Plus con il Clorpirifos - metile
		LAMINARINA	VACCIPLANT	-	1	-	-
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5 ecc	200	2,2	7	Al massimo 1 trattamento all'anno
		ACETAMIPRID (1)	EPIK SL	100 - 150	2	14	Al massimo 1 trattamento all'anno contro afide grigio ACETAMIPRID: al massimo 1 intervento contro afide grigio per un massimo di 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		FLONICAMID	TEPEKI	9.3	0,14	21	Al massimo 1 intervento all'anno
PRE FIORITURA 	COLPO DI FUOCO BATTERICO	PRODOTTI RAMEICI	SELECTA DISPERS ecc	200 - 300	4,5	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva
		ACIBENZOLAR - S - METILE	BION 50 WG	15	0,2	14	Al massimo 6 interventi all'anno
		FOSETIL AL	ALLETTE ecc	50	0,75	28	Per il numero di trattamenti massimo all'anno fare riferimento all'etichetta dei diversi prodotti ATTENZIONE: non tutti i formulati sono registrati contro il colpo di fuoco batterico
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	250	4	3	Al massimo 4 interventi all'anno
		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS	AMYLO - X	160	2,5	3	Al massimo 6 interventi all'anno


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
FIORITURA BBCH 65	TICCHIOLATURA	EXITIAZOX	MATACAR FL ecc	20	0,3	14	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
			VERTIMEC PRO	75	1,2	28	Con Abamectina al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità entro la fine di giugno
CADUTA PETALI  BBCH 69	ERIOFIDE RUGGINOSO	PROTEINATO DI ZOLFO	SULFAR ecc	300	4,5	5	-
		ZOLFO	THIOPRON	300 - 400	4,5	5	-
ALLEGAGIONE  BBCH72	TENTREDINE + AFIDE GRIGIO (contro la TENTREDINE interventi consentiti dopo la fioritura)	ACETAMIPRID	EPIK SL	100 - 150	2	14	(1) Prodotti in alternativa tra loro, al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità ACETAMIPRID: al massimo 1 intervento contro tentredine e afide grigio per un massimo di 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità **ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi IMIDACLOPRID, THIAMETOXAN, CLOTIANIDIN POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA
		THIAMETOXAM (1)**	ACTARA 25 WG	30 - 40	0,45	14	
		IMIDACLOPRID (1)**	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	28	
		FLONICAMID	TEPPEKI	9,3	0,14	21	
	AFIDE GRIGIO	SPIROTRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità e comunque al massimo 1 su ciascun fitofago
		FOSETIL AL	ALLETTE ecc	250	3,75	28	Per il numero di trattamenti massimo all'anno fare riferimento all'etichetta dei diversi prodotti
		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200 - 250	3	35	Al massimo 4 interventi all'anno E' consentito l'uso dei ditocarbammati solo fino a 40 giorni dalla raccolta
		CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	60 - 80	1	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con FLUDIOXONIL
	MACULATURA BRUNA (Ammessi gli interventi solo sulle varietà sensibili nei confronti di questa avversità: Abate Fetei, Conference, Decana del comizio, Passacrassana, Kaiser, Generale Leclerc)	BOSCALID	CANTUS ecc	27	0,4	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con il BOSCALID Con gli SDHI BOSCALID, PENTHIOPIRAD E FLUOPYRAM al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente
		FLUAZINAM	BANJO ecc	70 - 100	1	60	Al massimo 3 trattamenti all'anno

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/HL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ALLEGAGIONE  BBCH72	MACULATURA BRUNA + TICCHIALATURA	PRODOTTI RAMEICI	SELECTA DISPERSS ecc	200 - 300	4,5	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva (3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente	
		TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	40 - 60	0,6	14	MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO CIPROCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno	
		TRIFLOXISTROBIN	FLINT	15	0,225	14	Le strobilurine Trifloxistrobina e Pyraclostrobina non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno	
	TICCHIALATURA	MACULATURA BRUNA + TICCHIALATURA	PENTHIOPYRAD	FONTELIS	75	1,25	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Con gli SDHI BOSCALID, PENTHIOPYRAD E FLUOPYRAM al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente
			FLUOPYRAN + TEBUCONAZOLO	LUNA EXPERIENCE	50	0,75	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Con gli SDHI BOSCALID, PENTHIOPYRAD E FLUOPYRAM al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente
		DITHIANON + PYRACLOSTROBIN	MACCANI	167	2,5	35	Le strobilurine Trifloxistrobina e Pyraclostrobina non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno Con Dithianon al massimo 4 trattamenti all'anno	
		DITHIANON	DELAN 70 WG	80	1,2	21	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	
	TICCHIALATURA	TICCHIALATURA	DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	170	2,5	35	Con il FOSFONATO DI POTASSIO al massimo 6 interventi all'anno. Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
			DODINA	SYLLIT 65 ecc	70 - 120	1,38	40	Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Le strobilurine Trifloxistrobina e Pyraclostrobina non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno Con Boscalid al massimo 2 trattamenti all'anno	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ALLEGAGIONE  BBCH72	TICCHIOLATURA	DIFENOCONAZOLO (3)	SCORE 10 WG ecc	37,5	0,6	14	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO, PENCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno	
		PENCONAZOLO (3)	TOPAS 10 EC ecc	40	0,6	14		
		TETRACONAZOLO (3)	DOMARK 125 ecc	30	0,3	14		
		MICLOBUTANIL (3)	THIOCIUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	15		
		CIPROCONAZOLO (3)	CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	7		
		FENBUCONAZOLO (3)	INDAR 5 EW ecc	65 - 70	1	28		
		POLISOLFURO DI Ca	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	1500	18	30		
		BICARBONATO DI POTASSIO	ARMICARB 85 ecc	320	5	1		
		LAMINARINA	VACCIPLANT	-	1	-		Al massimo 5 trattamenti all'anno
		GRANULOSIS VIRUS	CARPOVIRUSINE EVO 2 ecc	100	1	3		Per il numero di trattamenti massimi fare riferimento alle etichette dei diversi prodotti
CARPOCAPSA	TRIFLUMURON (2)	ALSYSTIN	25	0,375	28	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - Tebufenozide) non deve essere superiore a 4 CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO ciascuno Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità		
	DIFLUBENZURON (2)	INDIPENDENT 25 PB	80	1,2	45			
	TEBUFENOZIDE (2)	MIMIC ecc	60	0,9	14			
	METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14			
	CLOTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,18 - 0,3	14			
	CLORPPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21		Complessivamente 3 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici.	
	FOSMET	SPADA 50 WG ecc	150	1,5	28		Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/mL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ALLEGAGIONE  BBCH72	CARPOCAPSA	SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
		THIACLOPRID	CALYPSO	25	0,38	14	Al massimo 1 trattamento all'anno nei 20 giorni che precedono la raccolta	
	COCCINIGLIA S. JOSE'	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità	
		CLOPPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Complessivamente 3 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLOPPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno	
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 2 trattamenti all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità e comunque al massimo 1 su ciascun fitoago	
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-	
	INGROSSAMENTO FRUTTO (LUGLIO - AGOSTO)  BBCH 74 - 79	CARPOCAPSA ACARI RICAMATORI PSILLA	CLOLRANTRANILIPROLE + ABAMECTINA	VOLIAM TARGO	75	1,2	14	Con abamectina al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità entro la fine di giugno
			TEBUFENOZIDE (2)	MIMIC ecc	60	0,9	14	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Influmuron - Diflubenzuron) e IMAC (Metoxifenozide - Tebufenozide) non deve essere superiore a 4
		RICAMATORI (Pandemis, Archips, Euilia)	METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO ciascuno
			INDOXACARB	STEWARD	16.5	0,247	7	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente l'avversità
SPINOSAD			SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
BACILLUS THURINGENSIS			VARI	100	1,5	3	-	
COCCINIGLIA S. JOSE'	CLOLRANTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,18 - 0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità		
	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità		


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
INGROSSAMENTO FRUTTO (LUGLIO - AGOSTO)  BBCH 74 - 79	PSILLA	ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	28	Con Abamectina al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità entro la fine di giugno
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 2 trattamenti all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità e comunque al massimo 1 su ciascun fitofago
		IN CASO D'INFESTAZIONI IMPORTANTI PROCEDERE CON PUNTUALI LAVAGGI DELLA VEGETAZIONE (SALI DI POTASSIO ECC) NELLA FASE D'INGROSSAMENTO FRUTTI PER MACULATURA BRUNA E TICCHIALATURA SONO UTILIZZABILI TUTTI I P.A. INDICATI NELLA FASE DI ALLEGAGIONE OLTRE A QUELLI SOTTO CONSIGLIATI					
	MACULATURA BRUNA (Ammessi gli interventi nei confronti di questa avversità: Abate Fetei, Conference, Decana del comizio, Passacrassana, Kaiser, Generale Leclerc)	FOSETIL AL	ALLETTE ecc	250	3,75	28	Per il numero di trattamenti massimo all'anno fare riferimento all'etichetta dei diversi prodotti
		TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	40 - 60	0,6	14	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno
		IPRODIONE	ROVRAL WG ecc	100	1,5	21	Al massimo 1 intervento all'anno
		BOSCALID	CANTUS ecc	27	0,4	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con il BOSCALID
		FLUDIOXONIL	GEOXE	30	0,45	3	Con gli SDHI BOSCALID, PENTHIOPIRAD E FLUOPYRAM al massimo 4 trattamenti all'anno complessivamente
		FLUAZINAM	BANJO ecc	70 - 100	1	60	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con FLUDIOXONIL
		CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150 - 160	2	21	Al massimo 3 trattamenti all'anno
TICCHIALATURA	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Le strobilurine Trifloxistrobin e Pyraclostrobin non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno Con Boscalid al massimo 2 trattamenti all'anno	
CYDIA DEL PESCO	TRIFLUMURON (2)	ALSYSTIN	25	0,375	28	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - Tebufenozide) non deve essere superiore a 4	
	METOXIFENOZIDE (2)	PRODIGY, INTREPID ecc	40	0,6	14	CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO ciascuno	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/HL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI/APPLICATIVI	
INGROSSAMENTO FRUTTO (LUGLIO - AGOSTO)  BBCH 74 - 79	CYDIA DEL PESCO	CLORPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200	4	21	Compressivamente 3 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno	
				80 - 120	1,8	7		
		PIRALIDE	SPINOSAD	SUCCESS ecc	30	0,45		Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad
				LASER ecc				
			CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,18 - 0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità
				AFFIRM	300	3,0 - 4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità
			ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
			BACILLUS THURINGENSIS	VARI	100	1,5	3	-
			INDOXACARB	STEWARD	16.5	0,247	7	Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno e comunque non più di 4 indipendentemente l'avversità
			ACETAMIPRID (1)	EPIK	100 - 150	2	14	Al massimo 1 trattamento all'anno contro le cimici per un massimo di 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
CIMICE (HALYOMORPHA HALYS)	TAU-FLUVALINATE	MAVRIK, KLARTAN ecc	40 - 120	0,6	30	Al massimo 1 intervento all'anno		
	CLORPIRIFOS METILE	RELDAN LO, RUNNER LO ecc	200 <small>(dosaggio riferito a un volume di acqua 1000 l/ha)</small>	4	21	Compressivamente 3 trattamenti all'anno per gli esteri fosforici. Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS METILE al massimo 1 trattamento all'anno		
PRE RACCOLTA	MALATTIE DA CONSERVAZIONE	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, 2 interventi per le cvs raccolte dopo il 15 settembre						
		PRODOTTI RAMEICI	SELECTA DISPERS ecc	200 - 300	4,5	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva	
		CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150 - 160	2	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente l'avversità Tra DITHIANON e CAPTANO al massimo 6 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS	55	0,8	7	Le strobilurine Trifloxistrobina e Pyraclostrobina non sono utilizzabili più di 3 volte all'anno Con Boscalid al massimo 2 trattamenti all'anno	
		FLUDIOXONIL	GEOXE	30	0,45	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità con FLUDIOXONIL	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/HL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
PRE RACCOLTA	MOSCA DELLA FRUTTA	DELTAMETRINA - ESCA	MAGNET MED	-	50 - 75 unità ettaro	-	Utilizzata come esca Attract and Kill con attrattivi alimentari	
POST RACCOLTA	ERIOFIDE VESCICOLOSO	PROTEINATO DI ZOLFO	SULFAR ecc	250 - 300	4,5	5	-	
CADUTA FOGLIE	NECROSI BATTERICA DELLE GEMME	PRODOTTI RAMEICI	SELECTA DISPERS ecc	200 - 300	4,5	7	Al massimo 6 kg/ha anno di sostanza attiva	
	CANCRI RAMEALI	DITHIANON	DELAN 70 WG	150	2,25	21	Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
AVVERSITA' OCCASIONALI								
-	ORGIA	TRIFLUMURON (2)	ALSYSTIN	25	0,375	28	(2) Tenuto conto delle limitazioni delle singole s.a. il numero complessivo dei trattamenti annui sulla coltura con Chitino - Inibitori (Triflumuron - Diflubenzuron) e MAC (Metoxifenozide - Tebufenozide) non deve essere superiore a 4	
		DIFLUBENZURON (2)	INDIPENDENT 25 PB	80	1,2	45	CON METOXIFENOZIDE al massimo 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON TRIFLUMURON e TEBUFENOZIDE al massimo 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO ciascuno	
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	100	1,5	3	-	
		FOSETIL AL	AL IETTE ecc	250	3,75	28	Per il numero di trattamenti massimo all'anno fare riferimento all'etichetta dei diversi prodotti	
		ACEQUINOCYL	KANEMITE	120	1,8	30	Al massimo 1 trattamento acaricida all'anno E' possibile impiegare clofentezine, exitiazox e etoxazolo in miscela con un adultiacida	
		CLOFENTEZINE	APOLLO SC ecc	30	0,4	35		
		EXITIAZOX	MATACAR FL ecc	20	0,3	14		
		TEBUFENPYRAD	MASAI 20 WP	33	0,5	7		
		ETOXAZOLE	BORNEO ecc	35	0,5	28		
		PIRIDABEN	NEXTER ecc	70	1	14		
AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA CONSIGLIATA	RAGNO ROSSO	ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	28		
		BIFENAZATO	ACRAMITE 480 SC	50 - 67	1	14		
		ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-		Distribuzione localizzata nella zona infestata
		METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-		
DALLA RIPRESA VEGETATIVA	UNGULATI	GRASSO DI PECORA	TRICO	-	15 - 20	-	-	

DISCIPLINARE DI DIFESA DEL PESCO

Stadi fenologici secondo Baggiolini - Scala BBCH



A Gemma d'inverno
BBCH00



B Gemma gonfia
BBCH01



C Calice visibile
BBCH55



D Bottoni rosa
BBCH57



E Inizio fioritura
BBCH60



F Fioritura
BBCH65





G Caduta petali
BBCH69






H Scamicatura-Allegagione
BBCH71







I Accrescimento frutto
BBCH75-79



EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
INGROSSAMENTO GEMME - ROTTURA GEMME  BBCH 01	BOLLA CORINEO CANCRO BATTERICO DEL PESCO	PRODOTTI RAMEICI	VARI	200 - 300	3 - 4,5	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.	
		DODINA	SYLLIT 65 ecc	80 - 120	1,38	75	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		DITHIANON	DELAN 70 WG	100 - 150	2,25	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	BOLLA	TIRAM (1)	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	42	(1) Tra TIRAM, ZIRAM e CAPTANO è consentito un numero massimo di 3 interventi all'anno. Con TIRAM al massimo 2 trattamenti all'anno Con ZIRAM al massimo 1 intervento all'anno Con CAPTANO al massimo 2 interventi all'anno	
		ZIRAM (1)	CRITAM WG ecc	200 - 450	3	Trattamenti ammessi fino a fine fioritura		
		CAPTANO (1)	MERPAN 80 WDG ecc	300	4,5			
	COCCINIGLIA AFIDE VERDE + ANARSIA LINEATELLA	OLIO BIANCO + ZOLFO	POLITHIOL		5000 - 6000	75 - 90	20	Intervenire prima dell'emissione degli abbozzi vegetativi non oltre la fase di gemma gonfia
			OLIO BIANCO	VARI	2000	30	20	-
		PYRIPROXIFEN	JUVINAL GOLD ecc		35 - 40 <small>(dosaggio riferito a un volume di acqua 600 - 1500 l/ha)</small>	0,21 - 0,6	-	Impiegabile solo prima della fioritura
			LASCAR ecc		37,5 - 50 <small>(dosaggio riferito a un volume di acqua 800 - 1000 l/ha)</small>	0,3 - 0,5	30	
APPLAUD PLUS				150 - 200	2	14		
AFIDE VERDE + ANARSIA LINEATELLA		TAU-FLUVALINATE	KLARTAN, MAVRIK ecc	40	0,6	30	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in alternativa ai piretroidi e solo in pre fioritura	
		FLONICAMID	TEPEKI	9.3	0,14	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Impiegabile solo su afide verde.	
BOTTONI ROSA  BBCH 57	AFIDE VERDE	ACETAMIPRID (2)	EPIK SL	130 - 200	2	14	(2) Prodotti in alternativa tra loro, al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità ACETAMIPRID unico neonicotinoide utilizzabile prima della fioritura!	
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	100	1,5	3	-	
	ANARSIA LINEATELLA	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	


EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
BOTTONI ROSA  BBCH 57	TRIPIDE FIORALE	TAU-FLUVALINATE (3)	KLARTAN, MAVRIK ecc	40	0,6	30	CONTRO IL TRIPIDE FIORALE SONO AMMESSI AL MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO (3) Con i PIRETROIDI al massimo 1 intervento all'anno in preforitura. Prodotti in alternativa tra di loro. LAMBDA-CIALOTRINA o ETOFENPROX in alternativa tra loro: al massimo 1 trattamento
		LAMBDA-CIALOTRINA (3)	KARATE ZEON 1.5 ecc	100 - 130	1,3	7	
		DELTA-METRINA (3)	DECIS EVO ecc	30 - 50	0,7	3	
		BETACIFLUTRIN (3)	BAYTEROID 25 EC ecc	50	0,7	7	
		CIPERMETRINA (3)	CIPERTHRIN PLUS ecc	50 - 75	1,13	14	
		ALFACIPERMETRINA (3)	CONTEST ecc	20 - 25	0,38	7	
		ZETA-CIPERMETRINA (3)	FURY ecc	200 - 220	3,3	14	
		TIOFANATE METIL	ENOVIT METIL FL ecc	90	1,4	3	
		DITHIANON	DELAN 70 WG	100 - 150	2,25	21	
		Trattamenti SOLO su autorizzazione del Settore Fitosanitario Regionale					
FIORITURA BBCH 65	TRIPIDE FIORALE	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno contro il tripide fiorale in alternativa a LAMBDA-CIALOTRINA
		CLORPIRIFOS METILE	RELDAN, RUNNER ecc	350	4,5	15	Con CLORPIRIFOS - METILE al massimo 1 trattamento all'anno (2 trattamenti a dosi dimezzati per giovani impianti che richiedono un volume di acqua non superiore a 1000 l)
CADUTA PETALI  BBCH 69	MONILIA	GLI INTERVENTI SPECIFICI CONTRO LA MONILIA NON POSSONO ESSERE PIU' DI 4 ALL'ANNO					
		FENPYRAZAMINE	PROLECTUS 50 WG	80 - 120	0,8 - 1,2	3	Al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
		DODINA	SYLLIT 65 ecc	80 - 120	1,38	75	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		BOSCALID	CANTUS	30 - 40	0,4	3	Tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		CYPRODINIL FLUDIOXONIL + CIPRODINIL	CHORUS ecc SWITCH	30 30	0,45 0,3	7 7	Tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
CADUTA PETALI  BBCH 69	MONILIA	DIFENOCNAZOLO (4)	SCORE 25 EC ecc	20 - 30	0,45	7	(4) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO, DIFENOCNAZOLO e PROPICONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno indipendentemente dall'avversità Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 trattamenti all'anno
		CIPROCONAZOLO (4)	CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	3	
		FENBUCONAZOLO (4)	INDAR 5 EW ecc	70 - 100	1,5	3	
		PROPICONAZOLO (4)	OPINION ecc	20 - 25	0,25	14	
		PENCONAZOLO (4)	TOPAS 10 EC ecc	40 - 50	0,75	14	
		MICLOBUTANIL (4)	THIOCUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	7	
		TEBUCONAZOLO (4)	FOLICUR WG ecc	75	1,125	7	
	MONILIA OIDIO	TRYFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (4)	FLINT MAX	20	0,3	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		TEBUCONAZOLO + FLUOPYRAM (4)	LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3	Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	50 - 75	0,75	3	Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno Tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		ZOLFO	VARI	150 - 500	7,5	5	-
		BUPIRIMATE	NIMROD ecc	50 - 100	1,5	14	-
		TETRACONAZOLO (4)	DOMARK 125 ecc	30	0,3	14	(4) I fungicidi IBE non possono essere utilizzati più di 4 volte l'anno indipendentemente dall'avversità
		OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO	PREV-AM PLUS	600	6	3	Al massimo 4 trattamenti all'anno
MONILIA BOLLA	TEBUCONAZOLO + ZOLFO (4)	TEBUZOL S DISPERS ecc	440	6,6	7	Con il TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	TRYFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (4)	FLINT MAX	20	0,3	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno	
	POLISOLFURO DI CALCIO	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	2 - 3	24	30	-	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
CADUTA PETALI  BBCH 69	BOLLA	TIRAM (1)	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	42	(1) Tra TIRAM, ZIRAM e CAPTANO è consentito un numero massimo di 3 interventi all'anno. Con TIRAM al massimo 2 trattamenti all'anno Con ZIRAM al massimo 1 intervento all'anno Con CAPTANO al massimo 2 interventi all'anno	
	BOLLA CORINEO	DODINA	SYLLIT 65 ecc	80	1,38	75	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		DITHIANON	DELAN 70 WG	100 - 150	2,25	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	AFIDE VERDE	PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5 ecc	150 - 200	2,2	7	Al massimo 1 trattamento all'anno	
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura	
		THIAMETOXAM (2)**	ACTARA 25 WG	15 - 20	0,25	14	(2) Prodotti in alternativa tra loro, al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	
		IMIDACLOPRID (2)**	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	21	** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi IMIDACLOPRID, THIAMETOXAN, CLOTHIANIDIN POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA	
		ACETAMIPRID (2)	EPIK SL	130 - 200	2	14		
	AFIDE FARINOSO	CLOTHIANIDIN (2)**	DANTOP 50 WG	12	0,17	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		FLONICAMID	TEPEKI	9.3	0,14	14		
SPIROTETRAMAT		MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura		
VEDI PRODOTTI RIPORTATI ALLA FASE DI CADUTA PETALI								
SCAMCIATURA (FINE MARZO - APRILE)	ERIOFIDE	ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	14	Con ABAMECTINA al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità per un totale di 2 sulla coltura	
	CYDIA MOLESTA + ERIOFIDE	CLOTRANILIPROLE + ABAMECTINA	VOLLIAM TARGO	75	1,2	14		
CYDIA MOLESTA BBCH 71 	1a generazione INSTALLAZIONE DELLA CONFUSIONE SESSUALE							
	TRIFLUMURON	ALSYSTIN		25	0,375	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.	
		CLOTRANILIPROLE	CORAGEN		18 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
SCAMICIATURA (FINE MARZO - APRILE)	 CYDIA MOLESTA	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		FOSMET (6)	SPADA 50 WG ecc	150	1,5	14	(6) Per questi prodotti (fosfororganici), tenuto conto delle limitazioni di ogni p.a., il n° complessivo di trattamenti annui sulla coltura non deve essere superiore a 3 e 4 per gli impianti in allevamento (primi 2 anni)
BBCH 71	CYDIA MOLESTA + EULIA	CLORPIRIFOS METILE (6)	RELDAN, RUNNER ecc	200	4,5	15	Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS - METILE al massimo 1 trattamento all'anno (2 trattamenti a dosi dimezzati per giovani impianti che richiedono un volume di acqua non superiore a 1000 l)
		METOXIFENOZIDE	PRODIGY, INTREPID ecc	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
ACCRESIMENTO FRUTTO (FINE MAGGIO)	COCCINIGLIA	CLORPIRIFOS METILE (6)	RELDAN, RUNNER ecc	200 - 250	4,5	15	(6) Per questi prodotti (fosfororganici), tenuto conto delle limitazioni di ogni p.a., il n° complessivo di trattamenti annui sulla coltura non deve essere superiore a 3 e 4 per gli impianti in allevamento (primi 2 anni)
		FOSMET (6)	SPADA WDG ecc	319	3,19	14	Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS - METILE al massimo 1 trattamento all'anno (2 trattamenti a dosi dimezzati per giovani impianti che richiedono un volume di acqua non superiore a 1000 l)
 BBCH 75 - 79	FORFICULE/NOTTUE	SPIROTRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-
	MACULATURA BATTERICA DELLE DRUPACEE	CLORPIRIFOS ETILE ESCA GRANULARE	CENTURIO	-	10 - 20	90	Esca granulare da applicare sul terreno lungo le file
		PRODOTTI RAMEICI	-	-	-	20	Al massimo 4 interventi all'anno in vegetazione Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno. ATTENZIONE: utilizzare formulazioni di rame selettive onde evitare fenomeni di fitotossicità!
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Al massimo 4 trattamenti all'anno
		ACYBENZOLAR METHYLE	BION 50 WG	10	0,15	7	Al massimo 5 trattamenti all'anno (Attenzione alle fitotossicità)

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ACCRESCIMENTO FRUTTO (INIZIO GIUGNO)  BBCH 75 - 79	CYDIA MOLESTA (2a gen) ANARSIA LINEATELLA (1a gen)	METOXIFENOZIDE	PRODIGY, INTREPID ecc	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Non ammesso per il LITOCOLLETE	
	CYDIA MOLESTA (2a gen) ANARSIA LINEATELLA (1a gen) LITOCOLLETE	TRIFLUMURON	ALSYSTIN	25	0,375	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	ANARSIA LINEATELLA (1a gen)	THIACLOPRID	CALYPSO	25	0,375	14	1 trattamento nel caso si utilizzi un altro neonicotinoide e 2 trattamenti complessivi per il gruppo dei neonicotinoidi E' consigliabile non impiegarlo prima dell'inizio di giugno solamente nel caso in cui in precedenza sia stato utilizzato un altro neonicotinoide (IMIDACLOPRID, THIAMETOXAM, ACETAMIPRID, CLOTIANIDIN)	
				50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		ETOFENPROX	TREBON UP	16.5	0,25	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		INDOXACARB	STEWARD	80 - 120	1,8	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
	ACCRESCIMENTO FRUTTO (META' GIUGNO - LUGLIO)  BBCH 75 - 79	MIRIDI	SPINOSAD	SUCCESS ecc	30	0,45		
				LASER ecc				
GLI INTEVENTI CONTRO LA CICALINA NON VENGONO CONTEGGIATI NEL CUMULO COMPLESSIVO DEI NEONICOTINOIDI E DELL'ETOFENPROX: Solo per gli impianti in allevamento (primi 2 anni)		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità e 2 trattamenti all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità	
		ACETAMIPRID (2)	EPIK SL	100	1,5	14	Al massimo 1 trattamento all'anno	
CICALINE		THIAMETOXAM	ACTARA 25 WG	20 - 30	0,3	14	Al massimo 1 trattamento tra IMIDACLOPRID e THIAMETOXAN contro la cicalina	
		IMIDACLOPRID	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	21	Prodotti in alternativa tra loro. Non trattare in prefloritura ed effettuare lo sfalcio delle fioriture naturali prima del trattamento.	
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Utilizzabile esclusivamente negli impianti in allevamento (primi 2 anni).	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ACCRESCIAMENTO FRUTTO (META' GIUGNO - LUGLIO)  BBCH 75 - 79	CICALINE	BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	100	1,5	14	Al massimo 1 trattamento all'anno
		ACRINATRINA	RUFAST E-FLO	20 - 30	0,3	7	
	CYDIA MOLESTA	FOSMET (6)	SPADA 50 WG ecc	150	1,5	14	(6) Per questi prodotti (fosfororganici), tenuto conto delle limitazioni di ogni p.a., il n° complessivo di trattamenti annui sulla coltura non deve essere superiore a 3 e 4 per gli impianti in allevamento (primi 2 anni) Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS - METILE al massimo 1 trattamento all'anno (2 trattamenti a dosi dimezzati per giovani impianti che richiedono un volume di acqua non superiore a 1000 l)
		CLORPIRIFOS METILE (6)	RELDAN, RUNNER ecc	200	4,5	15	
		METOXIFENOZIDE	PRODIGY, INTREPID ecc	50	0,75	7	
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	
		THIACLOPRID	CALYPSO	25	0,375	14	
		SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	
		CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,3	14	
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4,0	7	
TRIPIDE ESTIVO	SPINOSAD	SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	METOXIFENOZIDE	PRODIGY, INTREPID ecc	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
PRE RACCOLTA (META' LUGLIO) BBCH 75 - 79	EULIA	CLORPIRIFOS METILE (6)	RELDAN, RUNNER ecc	200	4,5	15	(6) Per questi prodotti (fosfororganici), tenuto conto delle limitazioni di ogni p.a., il n° complessivo di trattamenti annui sulla coltura non deve essere superiore a 3 ed a 4 per gli impianti in allevamento (primi 2 anni) Con FOSMET al massimo 2 trattamenti all'anno Con CLORPIRIFOS - METILE al massimo 1 trattamento all'anno (2 trattamenti a dosi dimezzati per giovani impianti che richiedono un volume di acqua non superiore a 1000 l)

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
PRE RACCOLTA (LUGLIO - AGOSTO) BBCH 75 - 79w	CYDIA MOLESTA	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	
		INDOXACARB	STEWARD	16.5	0,247	7		
		SPINOSAD	SUCCESS ecc	80 - 120	1,8	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
			LASER ecc	30	0,45			
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	100	1,5	3	-	
	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
	GLI INTERVENTI SPECIFICI CONTRO LA MONILIA NON POSSONO ESSERE PIU' DI 4 ALL'ANNO							
	MONILIA	FENEXAMIDE	TELDOR PLUS ecc	100	1,5	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		FENBUCONAZOLO (4)	INDAR 5 EW ecc	100	1,5	3	(4) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente	
		CIPROCONAZOLO (4)	CIPREN 10 WG ecc	12.5 - 20	0,3	3	MICLOBUTANIL, TEBUCONAZOLO, CIPROCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO e PROPICONAZOLO utilizzabili per un massimo di 2 volte all'anno ciascuno indipendentemente dall'avversità	
TEBUCONAZOLO (4)		FOLICUR WG ecc	75	1,125	7	Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 trattamenti all'anno		
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL		SWITCH	60	1	7	Tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
CYPRODINIL		CHORUS ecc	50	0,75	7	Tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
BOSCALID		CANTUS	30 - 40	0,4	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		BELLIS DRUPACEE ecc	50 - 75	0,75	3	Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno		
TEBUCONAZOLO + FLUOPYRAM (4)		LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
TRYFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (4)		FLINT MAX	20	0,3	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		
BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno			
						Al massimo 4 trattamenti all'anno		

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
PRE RACCOLTA (LUGLIO - AGOSTO) BBCH 75 - 79w	MONILIA	BICARBONATO DI POTASSIO	ARMICARB 85 ecc	320	5	1	Al massimo 5 trattamenti all'anno Applicabile quando il 90 % dei frutti ha raggiunto la taglia commerciale di BBCH79 fino a completa maturazione BBCH89
		FENPYRAZAMINE	PROLECTUS 50 WG	80 - 120	0,8 - 1,2	3	Al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
CADUTA FOGLIE BBCH 93	MOSCA DELLA FRUTTA	DELTAMETRINA - ESCA	MAGNET MED	-	50 - 75 unità ettaro	-	Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi alimentari
		ACETAMIPRID (2)	EPIK SL	130 - 200	2	14	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità
	CANCRI RAMEALI BATTERIOSI	PRODOTTI RAMEICI	VARI	400 - 500	7,5	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
	CANCRI RAMEALI	DITHIANON	DELAN 70 WG	100 - 150	2,25	21	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
DOPO CADUTA FOGLIE	BOLLA + BATTERIOSI	TIOFANATE METIL	ENOVIT METIL FL ecc	90	1,4	3	Al massimo 2 interventi all'anno dopo la raccolta e non oltre la fase di pre-floritura previa autorizzazione del tecnico
		PRODOTTI RAMEICI	VARI	400 - 500	7,5	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
	BOLLA	DODINA	SYLLIT 65 ecc	80 - 120	1,38	75	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		TIRAM (1)	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	42	(1) Tra TIRAM, ZIRAM e CAPTANO è consentito un numero massimo di 3 interventi all'anno. Con TIRAM al massimo 2 trattamenti all'anno Con ZIRAM al massimo 1 intervento all'anno Con CAPTANO al massimo 2 interventi all'anno
		ZIRAM (1)	CRITAM DG ecc	200 - 450	3	Trattamenti ammessi fino a fine fioritura	
		CAPTANO (1)	MERPAN 80 WDG ecc	300	4,5		

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
AVVERSAITA' OCCASIONALI							
AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA CONSIGLIATA	RAGNO ROSSO	EXITIAZOX	MATACAR FL ecc	20	0,3	14	Contro il Ragno Rosso al massimo 1 trattamento all'anno E' possibile utilizzare l'Exitiazox ed Etoxazole in miscela con un adultiocida Con ABAMECTINA massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversita': 1 contro eriofide e 1 contro ragno rosso
		TEBUFENPYRAD	MASAI 20 P	40	0,65	14	
		ETOXAZOLE	BORNEO ecc	30 - 50	0,5	14	
		PIRIDABEN	NEXTER ecc	50 - 75	1	14	
		ACEQUINOCYL	KANEMITE	120	1,8	14	
		ABAMECTINA	VERTIMEC EC ecc	75	1,125	14	
		ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	
-	LIMACCE	METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata
		GRASSO DI PECORA	TRICO	-	15 - 20	-	-

DISCIPLINARE DI DIFESA DEL SUSINO

Stadi fenologici secondo Baggiolini - Scala BBCH



A Gemma d'inverno
BBCH00



B Gemma gonfia
BBCH01



C Bottoni fiorali
BBCH55



D Bottoni separati
BBCH57



E Stami visibili
BBCH60



F Fioritura
BBCH65



G Caduta petali
BBCH69





H Allegagione
BBCH71





I Scamicatura
BBCH72



I Accrescimento frutto
BBCH75-79

EPOCA DI INTERVENTO	AWERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
GEMME GONFIE BBCH 01	BATTERIOSI	RAMEICI	VARI	varia	varia	-	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
BOTTONI FIORALI  BBCH 65	COCCINIGLIA S. JOSE	OLIO BIANCO	VARI	2000	30	20	-
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	Intervenire entro la fase di bottoni rosa su larve di I e II età
		PYRIPROXIFEN	JUVINAL GOLD ecc	35 - 40 (dosaggio riferito a un volume di acqua 600 - 1500 l/ha)	0,21 - 0,6	-	Impiegabile solo prima della fioritura
LASCAR ecc		37,5 - 50 (dosaggio riferito a un volume di acqua 800 - 1000 l/ha)	0,3 - 0,5	30			
BOTTONI SEPARATI  BBCH 57	AFIDI	FLONICAMID	TEPEKI	9,3	0,14	35	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17,5 ecc.	200	2,2	7	Al massimo 1 intervento all'anno
		ACETAMIPRID (1)	EPIK	120	1,8	14	(1) Sostanze attive in alternativa tra loro, al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
CORINEO	TRIPIDI	BETACYFLUTRIN (2)	BAYTEROID 25 EC ecc	50	0,7	7	(2) E' ammesso 1 solo trattamento all'anno contro questa avversità.
		DELTAMETRINA (2)	DECIS EVO ecc	30 - 50	0,7	7	Sostanze in alternativa tra loro, al massimo 1 trattamento all'anno e solo in pre-fioritura.
		LAMBDAIALOTRINA (2)	KARATE ZEON 1.5 ecc	100 - 130	1,3	7	
		ZIRAM	CRITAM WG ecc	200 - 450	3	-	Al massimo 1 intervento all'anno con ZIRAM
FIORITURA BBCH 65		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	14	Al massimo 2 trattamenti all'anno, 1 solo se si utilizza ZIRAM
Trattamenti SOLO su autorizzazione del Settore Fitosanitario Regionale							
CADUTA PETALI BBCH 69	AFIDI	FLONICAMID	TEPEKI	9,3	0,14	35	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura


EPOCA DI INTERVENTO	AWERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
CADUTA PETALI  BBCH 69	AFIDI	ACETAMIPRID (1)	EPIK	120	1,8	14	(1) Sostanze attive in alternativa tra loro, al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ** ATTENZIONE: IMIDACLOPRID IMPIEGABILE SOLO DOPO LA FIORITURA	
	AFIDI TENTREDINE	IMIDACLOPRID (1)**	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	21		
	Al massimo 5 interventi all'anno contro MONILIA							
	MONILIA		FENEXAMIDE	TELDOR PLUS	100	1,5	3	Utilizzabili non più di 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità.
			TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	50 - 75	0,9	7	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente.
			TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (3)	FLINT MAX	20	0,3	7	Con i p.a. PROPICONAZOLO, CIPROCONAZOLO, MICLOBUTANIL e TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno ciascuno.
			PROPICONAZOLO (3)	PROPYDOR	60	0,8	14	
			FENBUCONAZOLO (3)	INDAR 5 EW ecc	70	1,5	3	Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 interventi all'anno
			MICLOBUTANIL (3)	THIOCUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	7	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
			CIPROCONAZOLO (3)	CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	7	
		CYPRODINIL CYPRODINIL+ FLUDIOXONIL	CHORUS SWITCH	30 30	0,45 0,3	7 14	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	
ALLEGAGIONE  BBCH 71	CORINEO RUGGINE	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0,75	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	
		BOSCALID	CANTUS ecc	40	0,4	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente	
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Al massimo 4 trattamenti all'anno	
		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	14	Al massimo 2 trattamenti all'anno, 1 solo se si utilizza ZIRAM	
		ZOLFO	VARI	varia	varia	5	-	
	TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	50	0,6	7	Con TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità		

EPOCA DI INTERVENTO	AWERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ACCRESCIMENTO FRUTTO  BBCH 75 - 79	CYDIA FUNEBRANA	TRIFLUMURON	ALSYSTIN	25	0,375	14	Al massimo 2 interventi all'anno	
		THIACLOPRID	CALYPSO	25	0,38	14	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	
	CYDIA FUNEBRANA	FOSMET	SPADA WDG ecc	319	3,19	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
			SUCCESS ecc LASER ecc	80 - 120 30	1,8 0,45	7 7	Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	CYDIA FUNEBRANA + ANARSIA LINEATELLA	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Al massimo 4 interventi all'anno	
	ACCRESCIMENTO FRUTTO (INIZIO GIUGNO) BBCH 75 - 79	COCCINIGLIA S. JOSE	FOSMET	SPADA WDG ecc	319	3,19	14	Con FOSMET al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
			SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura
ACCRESCIMENTO FRUTTO (FINE GIUGNO - INIZIO LUGLIO) BBCH 75 - 79	EULIA	CLORANTRANILIPROLE	CORAGEN	16 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	varia	varia	3	-	


EPOCA DI INTERVENTO	AWERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
PRE RACCOLTA (FINE AGOSTO - INIZIO SETTEMBRE)	MONILIA	FENEXAMIDE	TELDOR PLUS	100	1,5	3	Utilizzabili non più di 2 volte all'anno indipendentemente dall'avversità.
		TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR WG ecc	50 - 75	0,9	7	(3) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 4 volte all'anno complessivamente.
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (3)	FLINT MAX	20	0,3	7	Con i p.a. PROPICONAZOLO, CIPROCONAZOLO, MICLOBUTANIL e TEBUCONAZOLO al massimo 2 interventi all'anno ciascuno.
		PROPICONAZOLO (3)	PROPYDOR	60	0,8	14	Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 interventi all'anno
		FENBUCONAZOLO (3)	INDAR 5 EW ecc	100	1,5	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		MICLOBUTANIL (3)	THIOCUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	7	
		CIPROCONAZOLO (3)	CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	7	
		CYPRODINIL	CHORUS	50	0,75	7	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL
		CYPRODINIL+ FLUDIOXONIL	SWITCH	60	0,9	14	
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0,75	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN
CADUTA FOGLIE BBCH 93	BATTERIOSI CORINEO	BOSCALID	CANTUS ecc	40	0,4	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Al massimo 4 intervento all'anno
		RAMEICI	VARI	300 - 500	0,45 - 0,75	-	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
AVVERSITA' OCCASIONALI							
DALLA RIPRESA VEGETATIVA	RAGNO ROSSO	PIRIDABEN	NEXTER	50 - 75	1	14	
		ETOXAZOLE	BORNEO	35 - 50	0,5	45	E' consentito un solo intervento acaricida all'anno
		ABAMECTINA	VERTIMEC PRO	75	1,25	28	
LIMACCE	LIMACCE	ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata
		METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-	
UNGULATI	UNGULATI	GRASSO DI PECORA	TRICO	-	15 - 20	-	

DISCIPLINARE DI DIFESA DELL'ALBICOCCO

Stadi fenologici - Scala BBCH



**A Gemma d'inverno
BBCH00**



**B Gemma gonfia
BBCH01**



**C Calice visibile
BBCH55**



**D Corolla visibile
BBCH57**



**E Stami visibili
BBCH60**



**F Fioritura
BBCH65**





**G Caduta petali
BBCH69**



**H Allegagione
BBCH71**



**I Accrescimento frutto
BBCH75-79**

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSTA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
GEMME GONFIE 	CORINEO	RAMEICI	VARI	200 - 300	3 - 4,5	20	Limitare a 6 kg di s. a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	42	Tra TIRAM e CAPTANO è consentito un numero massimo di 2 interventi all'anno. Con Captano al massimo 1 trattamento all'anno.
		CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150	2,25	21	
		OLIO BIANCO	VARI	1500 - 2000	22,5 - 30	20	-
		OLIO BIANCO + ZOLFO	POLITHIOL	5000 - 6000	75 - 90	20	Intervenire prima dell'emissione degli abbozzi vegetativi non oltre la fase di gemma gonfia
BBCH 01	COCCINIGLIA	PYRIPROXIFEN	JUVINAL GOLD ecc	35 - 40	0,21 - 0,6 (1500 L/ha)	Trattamenti ammessi prima della fioritura	Al massimo 1 trattamento all'anno prima della fioritura
			LASCAR ecc	37,5 - 50	0,5 (1000 L/ha)		
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-
FIORITURA BBCH 65	Trattamenti SOLO su autorizzazione del Settore Fitosanitario Regionale						
CADUTA PETALI 	AFIDI	IMIDACLOPRID (1)	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	35	(1) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID E THIAACLOPRID
		ACETAMIPRID (1)	EPIK	120	1,8	14	(IMIDACLOPRID solo dopo la fioritura)
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17,5 ecc.	200	2,2	7	Al massimo 1 trattamento all'anno
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
		INDOXACARB	STEWARD	16,5	0,2	7	Al massimo 2 interventi all'anno
ANARSIA L.	THIAACLOPRID (1)	CALYPSO	25	0,375	14	Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID E THIAACLOPRID	
	CLOTRANILIPROLE	CORAGEN	18 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSTA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
CADUTA PETALI  BBCH 69	MONILIA	Contro questa avversità non più di 5 interventi all'anno						(2) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 3 volte all'anno complessivamente Con i p.a. TEBUCONAZOLO, MICLOBUTANIL, CIPROCONAZOLO e PROPICONAZOLO al massimo 2 trattamenti l'anno ciascuno Con FLUOPYRAM al massimo 2 trattamenti all'anno Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente Al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità (1) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID E THIAACLOPRID (IMIDACLOPRID solo dopo la fioritura) Al massimo 1 trattamento all'anno Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità dopo la fioritura
		TEBUCONAZOLO (2)	FOLICUR WG ecc	75	1,125	7		
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (2)	FLINT MAX	20	0,3	7		
		FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLO (2)	LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3		
		MICLOBUTANIL (2)	THIOCUR FORTE ecc	125 - 150	2,25	7		
		FENBUCONAZOLO (2)	INDAR 5 EW ecc	100	1,5	3		
		PROPICONAZOLO (2)	OPINION ECNA ecc	25	0,25	14		
		CYPRODINIL (3)	CHORUS	30	0,45	7		
		CYPRODINIL + FLUDIOXONIL (3)	SWITCH	30	0,3	14		
		FENEXAMIDE	TELDOR PLUS ecc	100	1,5	3		
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0,75	3		
		BOSCALID	CANTUS ecc	40	0,4	3		
		FENPYRAZAMINE	PROLECTUS 50 WG	80 - 120	0,8 - 1,2	3		
		IMIDACLOPRID (1)	CONFIDOR 200 SL ecc	50	0,75	35		
		ACETAMIPRID (1)	EPIK	120	1,8	14		
PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5 ecc.	200	2,2	7				
SPIROTE TRAMAT	MOVENTO 48 SC	250	3,75	21				
GEOMETRIDI	BACILLUS THURINGENSIS	Varie	Varie	3				

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSTA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
CADUTA PETALI 	NERUME	ZOLFO	VARI	200	3	5	-	
	CORINEO NERUME	TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	42	Con TIRAM al massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	
	CORINEO	CAPTANO	MERPAN 80 WDG ecc	150	2,25	21	Tra TIRAM e CAPTANO è consentito un numero massimo di 2 interventi all'anno. Con Captano al massimo 1 trattamento all'anno	
ACCRESCIMENTO FRUTTO BBCH 75 - 79	FORFICULA NOTTUE	CLORPIRIFOS ETILE ESCA GRANULARE	CENTURIO	-	10 - 20	-	DA APPLICARE SUL TERRENO LUNGO LE FILE	
		SPIROTE TRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità dopo la fioritura	
	COCCINIGLIA	BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	-	
		ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
	ANARSIA L.	METOXIFENOZIDE	PRODIGY ecc	50	0,75	7	Al massimo 2 interventi all'anno	
		SPINOSAD	SUCCESS ecc	80 - 120	1,8	7	Al massimo 3 interventi all'anno con spinosad	
			LASER ecc		30	0,45	7	
		INDOXACARB	STEWARD	16.5	0,2	7	Al massimo 2 intervento all'anno	
	ANARSIA L. EULIA	THIACLOPRID (1)		CALYPSO	25	0,375	14	Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID e THIACLOPRID
		CLORANTRANILIPROLE		CORAGEN	16 - 20	0,3	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
EMAMECTINA BENZOATO			AFFIRM	300	4,0	7	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
BACILLUS THURINGENSIS			VARI	Varie	Varie	3	-	
ZOLFO			VARI	150 - 200	2,25 - 3	5	-	
BUPIRIMATE			NIMROD 250 EW ecc	50 - 100	1,5	14	-	
OIDIO	CIPROCONAZOLO (2)		CIPREN 10 WG ecc	12,5	0,187	14	(2) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 3 volte all'anno complessivamente Con i p.a. TEBUCONAZOLO, MICLOBUTANIL, CIPROCONAZOLO e PROPICONAZOLO al massimo 2 trattamenti l'anno ciascuno	
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (2)		FLINT MAX	20	0,3	7	Con FLUOPYRAM al massimo 2 trattamenti all'anno
	FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLO (2)		LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente	

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSTIA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
Contro questa avversità non più di 5 interventi all'anno							
PRE RACCOLTA BBCH 75 - 79	MONILIA	FENEXAMIDE	TELDOOR PLUS ecc	100	1,5	3	Al massimo 2 interventi all'anno
		TEBUCONAZOLO (2)	FOLICUR WG ecc	75	1,125	7	(2) Tutti gli IBE non possono essere usati più di 3 volte all'anno complessivamente
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (2)	FLINT MAX	20	0,3	7	Con i p.a. TEBUCONAZOLO, MICLOBUTANIL, CIPROCONAZOLO e PROPICONAZOLO al massimo 2 trattamenti l'anno ciascuno
		FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLO (2)	LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3	Con Fluopyram al massimo 2 trattamenti all'anno
		FENBUCONAZOLO (2)	INDAR 5 EW ecc	100	1,5	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		CIPROCONAZOLO (2)	CIPREN 10 WG ecc	20	0,3	14	
		CYPRODINIL + FLUDIOXONIL (3)	SWITCH	60	1	14	(3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra CYPRODINIL e CYPRODINIL + FLUDIOXONIL
		CYPRODINIL (3)	CHORUS	50	0,75	7	
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0,75	3	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN
		BOSCALID	CANTUS ecc	40	0,4	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		BICARBONATO DI POTASSIO	ARMICARB 85 ecc	320	5	1	Al massimo 5 trattamenti all'anno
		BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Applicabile quando il 90 % dei frutti ha raggiunto taglia commerciale di BBCH79 fino a completa maturazione BBCH89
		FENPYRAZAMINE	PROLECTUS 50 WG	80 - 120	0,8 - 1,2	3	Al massimo 4 interventi all'anno
CADUTA FOGLIE BBCH 93	BATTERIOSI	RAMEICI	VARI	400 - 500	6 - 7,5	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
AVVERSTIA' OCCASIONALI							
-	LIMACCE	ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata
		METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-	
		UNGULATI	GRASSO DI PECORA	-	15 - 20	-	-

DISCIPLINARE DI DIFESA DEL CILIEGIO

Stadi fenologici - Scala BBCH



A Gemma d'inverno
BBCH00



B Gemma gonfia
BBCH01



C Bottoni rosa
BBCH55



D Corolla visibile
BBCH57



E Stami visibili
BBCH60



F Fioritura
BBCH65



G Caduta petali
BBCH69



H Allegagione
BBCH71



I Scamiciatura
BBCH72



I Accrescimento frutto
BBCH75-79

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA*	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
GEMME GONFIE BBCH 01	COCCINIGLIA	OLIO BIANCO	VARI	2000 - 3000	30 - 45	20	-
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	14	Intervenire entro la fase di bottone rosa
	CORINEO	PYRIPROXYFEN	LASCAR ecc	37.5 - 50	0.5 (1000 L/ha)	-	TRATTAMENTO AMMESSO SOLO PRIMA DELLA FIORITURA
TIRAM		POMARSOL 80 WG ecc	200	3	14	Al massimo 2 interventi all'anno entro la fase di scamicciatura	
FIORITURA BBCH 65	CORINEO CILINDROSPORIOSI	PRODOTTI RAMEICI	VARI	varia	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.
		Trattamenti SOLO su autorizzazione del Settore Fitosanitario Regionale					
CADUTA PETALI BBCH 69	MONILIA	Al massimo 3 trattamenti all'anno contro l'avversità MONILIA					
		TEBUCONAZOLO (1)	FOLICUR WG ecc	50 - 75	1, 125	7	(1) Con gli I.B.E. al massimo 3 interventi all'anno
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (1)	FLINT MAX	20	0.3	7	Con i p.a. PROPICONAZOLO e TEBUCONAZOLO al max 2 trattamenti all'anno ciascuno Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 trattamenti all'anno
		FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLO	LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0.75	3	Con gli SDHI (BOSCALID - FLUOPYRAM) al massimo 2 trattamenti all'anno
		FENBUCONAZOLO (1)	SIMITAR EVO ecc	200	3	5	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		PROPICONAZOLO (1)	PROPYDOR	60	0.8	14	
		FENEXAMIDE	TELDOR PLUS	100	1.5	3	Al massimo 2 interventi all'anno
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0.75	3	Tra BOSCALID e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
		BOSCALID	CANTUS ecc	40	0.4	3	Con gli SDHI (BOSCALID - FLUOPYRAM) al massimo 2 trattamenti all'anno
		CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	30	0.3	7	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente
		TIRAM	POMARSOL 80 WG ecc	200	3	14	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
		CORINEO					

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
ALLEGAGIONE BBCH 71	CILINDROSPORIOSI APIGNOMONIA	DODINA	SYLLIT 65	80	1,04	14	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità in post fioritura	
		IMIDACLOPRID (2)** ACETAMIPRID (2)	CONFIDOR ecc EPIK SL	50 130 - 200	0,75 2	21 14	(2) Con i NEONICOTINOIDI al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Prodotti in alternativa tra loro.	
	AFIDE NERO	THIAMETOXAM (2)**	ACTARA 25 WG ecc	30	0,45	7	** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi imidacloprid, thiametoxan POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA	
		PIRIMICARB	PIRIMOR 17.5 ecc	150 - 200	2,2	7	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		PIRETRO NATURALE	VARI	varie	varie	2	-	
	COCCINIGLIA	FOSMET	SPADA WDG ecc	319	3,19	14	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	
		SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 SC	300	4,5	21	Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità e dopo la fioritura	
	RECURVARIA	BACILLUS THURINGENSIS	VARI	Varie	Varie	3	-	
	PRE RACCOLTA BBCH 75 -79	MOSCA DEL CILIEGIO	Contro questa avversità è ammesso solo 1 intervento a tutta chioma					
			SPINOSAD	SPINTOR FLY	-	1,2	7	Al massimo 5 interventi all'anno
FOSMET			SPADA WDG ecc	319	3,19	14	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	
ETOFENPROX			TREBON UP	50	0,75	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	
THIAMETOXAM (2)**			ACTARA 25 WG ecc	30	0,45	7	(2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Prodotti in alternativa tra loro.	
ACETAMIPRID (2)			EPIK SL	130 - 200	2	14	** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi imidacloprid, thiametoxan POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA	
ESCA PROTEICA ATTIVATA CON FOSMET - IMPIEGARE TRAPPOLE CROMOTROPICHE DI COLORE GIALLO								
Interventi agronomici: - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti								
I p.a. etofenprox e fosmet previsti per la difesa da altre avversità svolgono un'azione collaterale contro la Drosophila suzukii								

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSAITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/ha	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI	
PRE RACCOLTA BBCH 75 - 79	DROSOPHILA SUZUKII	ACETAMIPRID (2)	EPIK SL	130 - 200	2	14	(2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Prodotti in alternativa tra loro. ** ATTENZIONE: i p.a. neonicotinoidi imidacloprid, thiametoxan POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DOPO LA FIORITURA	
		DELTAMETRINA	DECIS EVO ecc	30 - 50	0,3 - 0,7	7	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità - impiegabile in pre-raccolta	
PRE RACCOLTA BBCH 75 - 79	MONILIA	Al massimo 3 trattamenti all'anno contro l'avversità MONILIA						
		TEBUCONAZOLO (1)	FOLICUR WG ecc	75	1,25	7	(1) Con gli I.B.E. al massimo 3 interventi all'anno	
		TRIFLOXISTROBIN + TEBUCONAZOLO (1)	FLINT MAX	20	0,3	7	Con i p.a. PROPICONAZOLO e TEBUCONAZOLO al massimo 2 trattamenti all'anno ciascuno Con FENBUCONAZOLO al massimo 3 trattamenti all'anno	
		FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLO	LUNA EXPERIENCE	40 - 50	0,75	3	Con gli SDHI (BOSCALID - FLUOPYRAM) al massimo 2 trattamenti all'anno	
		FENBUCONAZOLO (1)	SIMITAR EVO ecc	200	3	5	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente	
		PROPICONAZOLO (1)	PROPYDOR	60	0,8	14	Al massimo 2 interventi all'anno	
		FENEXAMIDE	TELDOR PLUS	100	1,5	3	Tra Boscalid e BOSCALID + PYRACLOSTROBIN al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Con gli SDHI (BOSCALID - FLUOPYRAM) al massimo 2 trattamenti all'anno	
		BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	BELLIS DRUPACEE ecc	60 - 75	0,75	3	Con TRIFLOXISTROBIN e PYRACLOSTROBIN al massimo 2 trattamenti all'anno complessivamente	
		BOSCALID	CANTUS ecc	40	0,4	3	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
		CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	60	1	7	Al massimo 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
CADUTA FOGLIE BBCH 93	MONILIA	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	170 - 265	4	3	Al massimo 4 trattamenti all'anno	
		CANCRI RAMEALI BATTERIOSI	RAMEICI	VARI	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno. In vegetazione al massimo 4 interventi all'anno.	
AVVERSAITA' OCCASIONALI								
DALLA RIPRESA VEGETATIVA	LIMACCE	ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata	
		METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-		
		GRASSO DI PECORA	TRICO	-	15 - 20	-	-	

DISCIPLINARE DI DIFESA DELL'ACTINIDIA

Stadi fenologici



Ingrossamento gemme



Ingrossamento gemme avanzato



Rottura gemme



Rottura gemme avanzato



Foglie affioranti



Fogli embricate



Infiorescenze affioranti



Foglie separate



Foglie distese-infiorescenze separate



Fioritura



Allegagione



Accrescimento frutticini

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSA'*	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
FINE INVERNO	BATTERIOSI MARCUMIE DEL COLLETTO	RAMEICI	varia	varia	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno
GEMME GONFIE	COCCINIGLIA	OLIO BIANCO + ZOLFO	POLITHIOL	5000	75	20	Non impiegare oltre lo stadio di gemme gonfie
		BUPROFEZIN	APPLAUD PLUS	150 - 200	2	45	Intervenire preferibilmente in occasione della prima generazione dell'anno
		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS	AMYLO - X	-	1.5	3	Al massimo 6 trattamenti all'anno
FGLIE DISTESE - INGROSSAMENTO FRUTTO	BATTERIOSI	ACYBENZOLAR - METILE	BION 50 WG	-	0.2	90	IN ATTESA DELLA REGISTRAZIONE TEMPORANEA DI 120 GG
		FORCHLORFENURON	SITOFEX	-	1.3 (0.6+0.7)	50	Utilizzo in preforitura contro Psa dal 27/02 al 26/06. Massimo 2 trattamenti in preforitura
		FOSETI ALLUMINIO	ALLETTE <small>(UNICO FORMULATO IN COMMERCIO REGISTRATO)</small>	250	5	40	Al max 2 interventi all'anno da pre frittura al pre raccolta
DALLA SFIORITURAA PRERACCOLTA	MARCUMIE DEL COLLETTO	RAMEICI	varia	varia	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno (Verificare con attenzione la presenza dell'avversità in etichetta)
		BACILLUS THURINGENSIS	VARI	Varie	Varie	3	-
ESTATE	EULIA	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0.75	7	Al max 1 intervento all'anno
	METCALFA	OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO	PREV-AM PLUS	800	8	3	Al massimo 3 trattamenti all'anno
	BATTERIOSI	RAMEICI	varia	varia	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno
CADUTA FOGLIE	MARCUMIE DEL COLLETTO	METALAXIL M	RIDOMIL GOLD SL	1 - 2 ml x mq della pianta	-	180	Nei trattamenti primaverili prestare molta ATTENZIONE ai tempi di carenza!!
		RAMEICI	varia	varia	varia	20	Limitare a 6 kg di s.a. all'anno
AVVERSA' OCCASIONALI							
	LIMACCE	ORTO FOSFATO DI FERRO	-	-	-	-	Distribuzione localizzata nella zona infestata
		METALDEIDE - ESCA	ALLOWIN ecc	-	5	-	
	UNGULATI	GRASSO DI PECORA	TRICO	-	15 - 20	-	-